La problématique des laits de début et fin de lactation

6 février 2014

Albi

Expérimentation réalisée par :

Avec le financement de :

Interprofession Lait de Brebis des Pyrénées Atlantiques

FranceAgriMer



Contexte

début et fin de lactation

Traitement antibiotique

Laits non fromageables

Laits non collectés

Dispositif de traitement

Décision professionnelle

Nécessité de connaitre :

- ✓Quantités lait concernées
- ✓Pratiques éleveurs

Nécessité de proposer des solutions de traitement :

- ✓Respectueuses de l'environnement
- ✓Applicables dans les exploitations

Étude 1 : PFT GH2O
- Enquêtes éleveurs
- Proposition de solutions

Résultats enquête

Quantités de laits non commercialisables non négligeables (moy > 3 500 L/an)
Quantités de lait = f (taille troupeau)
→ A vérifier / mesures

Pratique la plus couramment utilisée (moitié des enquêtés)
→ Dépôt sur tas de fumier

Quantité de fumier sur exploitations
→ Ok pour absorption de ces laits

Solutions envisagées

1. Valorisation alimentation animale après transformation (fermentation)
   - ▪Inadaptée à grande échelle : majoritairement exploitations spécialisées ou bovin / ovin
   - ▪Production saisonnée → coût logistique, process difficile à amortir ; recherche clients difficile
2. Livraison auprès méthaniseur
   - ▪Taux humidité + saisonnalité → Difficultés techniques actuellement
3. Élaborer bonnes pratiques pour absorption par fumier
   - ▪Solution retenue

Le projet d'Expérimentation

Mettre à jour des bonnes pratiques de gestion des laits non commercialisables par le traitement sur tas de fumier

✓Un projet d'expérimentation avec

✓Un comité de pilotage : interprofessions, organismes techniques et développement des trois bassins français de lait de brebis (Rayon de roquefort, Pyrénées-Atlantiques et Corse)

Interprofession Lait de Brebis des Pyrénées Atlantiques

✓Avec expertise technique

✓Coordonné par

Le projet d'Expérimentation

✓Un projet financés par

FranceAgriMer

ADOUR-GARONNE

TARN
CONSEIL GENERAL